Genetik der Porphyrrie

Xiaoye Schneider-Yin
Zentrallabor, Stadtspital Triemli
Zürich

Alle Porphyrrien, mit Ausnahme der sporadischen Form der Porphyrria cutanea tarda (sPCT), sind Erbkrankheiten.

Ursache

Ursache

Häm-biosynthese und Porphyrrie

Häm-biosynthese und Porphyrrie

Häm-biosynthese und Porphyrie

Mono-Gene-Vererbung (oder Mendelsche Vererbung)

Diese Art der Vererbung wird verursacht durch Änderungen oder Mutationen in der DNS-Sequenz eines einzigen Gens.

Vererbung

dominant

In autosomal-dominanter Vererbung besteht ein Fehler in einem der 22 Chromosomen-Paare. Das geschädigte Gen des einen Elternteils dominiert das normale Gen des andern Elternteils. Wenn ein Elternteil eine Krankheit hat, die durch ein autosomal-dominantes Gen verursacht ist, haben die Kinder ein **50% Risiko**, das dominante Gen zu erben und eine 50% Chance, dieses Gen nicht zu erben.

rezessiv

Vererbungsmuster einer Charakteristik oder Abnormität in der zwei abnormale Gene oder Allele nötig sind, um die Charakteristik oder Abnormität zu übertragen, im Gegensatz zur dominanten Vererbung, die nur ein abnormes Gen benötigt.

Hereditäre Porphyrie

autosomal dominant
(unvollständige Penetranz)

autosomal rezessiv

akut	<ul style="list-style-type: none"> AIP (acute intermittent porphyria) VP (variegate porphyria) HC (hereditary coproporphyria) 	ADP (ALAD deficiency porphyria)
		CEP (congenital erythropoietic porphyria)
		HEP (hepatoerythropoietic porphyria)
nicht akut	<ul style="list-style-type: none"> PCT (familial porphyria cutanea tarda) EPP (erythropoietic protoporphyria) 	

Erworbene Porphyrie

sPCT

Unvollständige Penetranz in dominanten Porphyrien

Mutationsanalyse (genetischer Test) in Familien mit akuten Porphyrien

... Suche nach prä-symptomatischen (asymptomatischen) Mutationsträgern, die wir dann über die Vermeidung eines Krankheitsausbruchs mit Porphyriesymptomen beraten können.

Was für Proben werden benötigt?

Blut ...
... erhältlich durch Venenpunktion

Wie werden genetische Tests durchgeführt?

Blutprobe entnehmen
↓
DNS isolieren
↓
ein spezifisches (Porphyrin-) Gen amplifizieren
↓
das Gen sequenzieren
↓
Mutation(en) identifizieren

Wie werden genetische Tests durchgeführt?

Blutprobe entnehmen
↓
DNS isolieren
↓
ein spezifisches (Porphyrin-) Gen amplifizieren
↓
das Gen sequenzieren
↓
Mutation(en) identifizieren

Segment eines normalen HMBS Gens

Mutation C517→T (R173W) in einem AIP-Patienten

Familienuntersuchung (Screening) zur Identifikation von Mutationsträgern

Restriction fragment length polymorphism (RFLP)-Analyse von Mutation G518→A (R173Q) in einer AIP-Familie

Wie empfindlich sind genetische Tests?

Effizienz der DNS-Analyse
in akut-intermittierender Porphyrie (AIP)

Frankreich¹ **90%** (109/121)

Effizienz der DNS-Analyse
in Porphyrin variegata (PV)

England & Frankreich⁴ **96%** (104/108)

Finnland⁵ **97%** (100/103)

Schweden⁶ **82%** (14/17)

Effizienz der DNS-Analyse
in erythropoetischer Protoporphyrin (EPP)

Frankreich & Schweiz² **90%** (26/29)

Italien³ **80%** (12/15)

¹Puy et al. *Am J Hum Genet.* 1997;
²Rüfenacht et al. *Eur Am J Hum Genet.* 1998;
³Aurizi et al. *Mol. Genet. Metab.* 2007.

⁴Whalley et al. *Am J Hum Genet.* 1999;
⁵Von und zu Franberg et al. *Eur J Hum Genet.* 2002;
⁶Wiman et al. *Clin Genet.* 2003.

Wenn keine Mutationen gefunden werden ...
... in 10-20% der Familien:

- klinische Symptome
 - erhöhte Porphyrin-Ausscheidung
 - verminderte Enzymaktivität
- } biochemische und enzymatische Tests

Hereditäre Porphyrie

autosomal dominant
(unvollständige Penetranz)

autosomal rezessiv

akut	<ul style="list-style-type: none"> AIP (acute intermittent porphyria) VP (variegate porphyria) HC (hereditary coproporphyria) 	<ul style="list-style-type: none"> ADP (ALAD deficiency porphyria) 			
			nicht akut	<ul style="list-style-type: none"> FPCT (familial porphyria cutanea tarda) EPP (erythropoietic protoporphyria) 	<ul style="list-style-type: none"> CEP (congenital erythropoietic porphyria) HEP (hepatoerythropoietic porphyria)

Erworbene Porphyrie

sPCT

Vererbung von EPP

EPP klinische Manifestation

benötigt

ein mutiertes Allel (vom einen Elternteil)

und

ein niedrig-exprimiertes Allel (vom andern Elternteil)

Das niedrig-exprimierte Allel

- intronischer SNP (single nucleotide polymorphism) **IVS3-48C**
- **IVS3-48C** führt zu partiellem Enzymdefekt (75% eines normalen Allels **IVS3-48T**)
- ein häufig-vorkommendes hypomorphisches Allel
- Häufigkeit Bevölkerungs-abhängig

Häufigkeit des niedrig-Exprimierungsallel (**IVS3-48C**)

Gouya et al, *Am J Hum Genet*, 2006
Aurizi et al, *Mol. Genet. Metab*, 2007.
Schneider-Yin, unpublished data

Genetische Tests in EPP

Genetische Tests in EPP

Genetische Beratung in EPP

Genetische Beratung in EPP

In der Schweiz: die Häufigkeit von IVS3-48C ist 7%

In der Schweiz: die Häufigkeit von IVS3-48C ist 7%

In Japan: die Häufigkeit von IVS3-48C ist 43%

In Japan: die Häufigkeit von IVS3-48C ist 43%

Niedrige Exprimierung in dominanten Porphyrien

autosomal-dominant
(unvollständige Penetranz)

EPP: ja
HC: ja

AIP: nein
VP: nein
#PCT: ?

Warum ?

Gouya et al, Hum Genet, 2004

Niedrige Exprimierung in dominanten Porphyrien

Warum ?

einige Mutationsträger entwickeln klinische Symptome, andere nicht

Unvollständige Penetranz in dominanten Porphyrien

Unvollständige Penetranz in dominanten Porphyrien

Wechselwirkung?

- Einzel-Gen-Vererbung?
- multi-faktorielle Vererbung (andere Gene involviert)?
- erworbene Voraussetzungen (Medikamente, Hormone, usw.)

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!